



KOLOSS TCMax

1 L

Selectief herbicide in maïs
in voor-opkomst en vroege na-opkomst
tegen eenjarige grasachtige
en eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Herbicide sélectif pour maïs
en pré-émergence
et en post-émergence précoce
contre les graminées
et dicotylées annuelles.

Hier openen/Ouvrir ici



Gevenaanduidingen

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P411 Bij maximaal 40°C bewaren.

Aanvullende informatie

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Mentions de danger

H361d Susceptible de nuire au fœtus.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P263 Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement.
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P391 Recueillir le produit répandu.
P411 Stocker à une température ne dépassant pas 40°C.

Informations supplémentaires

EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Gefahrenhinweise

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P263 Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.
P308+ P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P411 Bei Temperaturen nicht über 40°C aufbewahren.

Ergänzende Informationen

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Toelatingsnummer: 10464P/B

Suspensie concentraat (SC) op basis van

90 g/l (7,6% w/w) thiencarbazone-methyl,
225 g/l (19% w/w) isoxaflutol
en 150 g/l (12,7% w/w) cyprosulfamide (beschermstof).

Numéro d'autorisation: 10464P/B

Suspension concentrée (SC) à base de

90 g/l (7,6% w/w) de thiencarbazone-méthyl,
225 g/l (19% w/w) d'isoxaflutole
et 150 g/l (12,7% w/w) de cyprosulfamide (phytoprotecteur).

Werkingswijze/Mode d'action

GROUP	2	27	HERBICIDE
-------	---	----	-----------

Koloss® TCMax: Trademark of Bayer Group

Lotnummer/Numéro de lot: zie op de verpakking/voir sur l'emballage.


Label version: 08/2023

© Copyright Bayer CropScience

BE84910643G

Tel. Antifict centrum/Le Centre Antipoisons: 070/245.245

UFI : J8Q0-80HU-Y006-5A03



GHS08



GHS09

WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG



www.agrirecover.eu

Toelatingshouder/Détenteur de l'autorisation:

Bayer CropScience SA-NV
Jan Mommaertslaan 14
1831 Diegem (Machelen)
Tel. 02/535 63 11
www.cropscience.bayer.be

Bayer

GEBRUIK EN GEBRUIKSDOSISSEN

Lees aandachtig het etiket voor gebruik.

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingsstijdstip van de teelt
Mais (behalve suikermais) (open lucht)	Eénjarige grasachtige onkruiden en éénjarige tweezaadlobbige onkruiden.	0,33 l/ha	Vanaf het stadium droog zaad tot en met het 3-bladstadium van de mais (BBCH 00-13)
	Toepassingsvoorwaarden: <ul style="list-style-type: none">• Max. 1 toepassing/teelt.• Risicobeperkende maatregelen: altijd een minimale bufferzone van 10 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		
Toepassingstechniek: bespuiting Algemene opmerking betreffende de dosis: De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn(en) te verkorten.			

BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor beroepsgebruik.
- **Maatregelen ter voorkoming van resistentievorming:**
 - SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 27 en 2.
 - Mais met onderzaai van grassen of vlinderbloemigen mag niet met Koloss® TCMax behandeld worden.
 - De na-opkomstbehandelingen moeten steeds uitgevoerd worden op gezonde mais, d.w.z. op mais die niet verzwakt is door ziekten, insecten, gebreksverschijnselen, koude-, droogte- of natheidsstress of andere factoren die de normale ontwikkeling van het gewas verstoren kunnen.
 - Tijdens een behandeling in na-opkomst en in de eerste uren na deze behandeling dient het gewas droog te zijn.
- **De behandeling in na-opkomst moet uitgesteld worden:**
 - bij sterke temperatuurschommelingen;
 - na een koude periode (minder dan 10 °C) en vooral als dit samengaat met neerslag;
 - indien nachtvorst wordt verwacht;
 - bij een temperatuur hoger dan 25°C of lager dan 8°C en op mais met een trage groei of verzwakt door lage temperaturen of droogte, gebreksziekten, insectenschade of door elke andere oorzaak.
- **Gewasveiligheid:**
 - Bij toepassing in koude en/of vochtige weersomstandigheden kan soms een tijdelijke gewaschade waargenomen worden. Op zeer natte bodems, in geval van hevige regen kort na de toepassing of in geval van een zeer verzwakt gewas kan een gewasreactie optreden in de vorm van tijdelijke verbleking van bladeren en gekrulde uitgroei van de jonge bladeren. Deze verschijnselen hebben echter geen invloed op de opbrengst.

• **Volgteelten:**

- Na de maïsoogst zijn in het kader van een normale vruchtopvolgving wintergerst en wintertarwe mogelijk na een diepe grondbewerking (min. 15 cm en een homogene menging van de grond). Raaigras is mogelijk na ploegen.
- In de lente na de maïsoogst zijn zomergerst en zomertarwe mogelijk na een diepe grondbewerking (min. 15 cm). Koolzaad, aardappelen en bieten zijn mogelijk na een diepe grondbewerking van minstens 15 cm met homogene menging van de grond.
- **Opmerking:** volgteelten zijn gebaseerd op veldstudies in bodems met normale, gunstige bodemtype-parameters (binnen streefzones voor o.a. % C, % org. N, pH) en onder normale agroklimatologische omstandigheden. Ongunstige bodemtype-parameters of ongunstige agroklimatologische omstandigheden, zoals lange droogteperiodes na de toepassing, koude temperaturen, waterverzadiging, gecompacteerd bodems, geërodeerde plekken, ... kunnen de snelheid van herbicide-afbraak en van de resterende hoeveelheid actieve stof beïnvloeden. In dergelijke gevallen kan het risico voor volgteelten worden verminderd door een geschikt ploegen van de bodem, voorafgaand aan de inzaai van de volgteelt. Deze grondbewerking dient op voldoende wijze de grond van verschillende dieptes te mengen. Elke vorm van minimale grondbewerking is niet aanbevolen in deze omstandigheden.
- De zaai of het planten van elke andere teelt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.
- **Vervangteelten (in geval van teeltmislukking):**
 - Bij mislukken van een maïsteelt kan er na één week opnieuw mais ingezaaid worden na een diepe grondbewerking.
 - Gelieve uw distributeur of Bayer CropScience te contacteren voor meer informatie over de mogelijke vervanggewassen na een teeltmislukking.
- **Mengbaarheid:**
 - In na-opkomst niet mengen met oliën of andere hulpstoffen, met vloeibare meststoffen of bladmeststoffen.
 - Gelieve voor de mogelijke mengingen contact te nemen met uw verdeler van gewas-beschermingsproducten.

BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING, BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING EN BEHANDELINGS-OVERSCHOTTEN

De verpakking goed schudden vóór gebruik.

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder met water aanvullen.

De zorgvuldig geleedigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelingspunt.

De behandelingsoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden.

Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

REINIGING SPUITAPPARATUUR

Koloss® TCMax bevat een stof uit de groep van de ALS-herbiciden waartoe ook de sulfonylureum-verbindingen behoren. Daarom is het uiterst belangrijk de tank goed te reinigen (inclusief filters en leidingen) alvorens een bespuiting uit te voeren in een andere teelt dan maïs.

MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN HET GROND- EN OPPERVLAKTEWATER

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigt.
- SPe2: Om in het water levende organismen te beschermen, mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geldt dit voor percelen die geklasseerd zijn als „Sterk erosiegevoelig“. Voor het Waals Gewest komt dit overeen met de percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen. Voor instructies bij een specifieke teelt: zie rubriek 'Gebruik en gebruiksdosis'.
- Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.
- Driftreductie: Vermijd spuitdrift naar naburige vegetatie, gronden en waterlopen door een aangepaste spuitapparatuur, waterhoeveelheid en rijsnelheid. Spuit bij windstil weer met aangepaste druk naargelang de specifieke aanbevelingen voor driftreducerende doppen.

VOORZORGSMATREGELEN

- Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van planten-beschermingsmiddelen geldig zijn.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.
- Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

AANWIJZINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Eerste hulp maatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen.
Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen.
Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer **het Antigifcentrum 070/245.245.**

WAARBORG

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

USAGE ET DOSE D'EMPLOI

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation du produit.

Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application de la culture
Maïs (sauf maïs doux) (plein air)	Les mauvaises herbes dicotylées annuelles et graminées annuelles	0.33 l/ha	Du stade graine sèche jusqu'au stade 3 feuilles du maïs (BBCH 00-13)
	Conditions d'application : <ul style="list-style-type: none">• Max. 1 application/culture.• Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon minimale de 10 mètres avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
Méthode d'application : pulvérisation			
Remarque générale concernant la dose: La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.			

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

• Produit destiné à un usage professionnel.

• **Mesures pour la prévention du développement de la résistance :**

- SPA1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 27 en 2.
- Un maïs avec un sous-semis de graminées ou de légumineuses ne peut pas être traité avec le Koloss® TCMaX.
- Les traitements de post-levée doivent être appliqués sur un maïs sain, c.-à-d. qui n'est pas affaibli par des maladies, des insectes, des carences, stress dû au froid, à la sécheresse ou à l'humidité ou d'autres facteurs pouvant perturber le développement normal de la culture.
- Lors d'un traitement en post-émergence, la culture doit être sèche. Quelques heures sans pluie après la pulvérisation sont nécessaires pour la pleine efficacité de l'application.

• **Retarder l'application en post-émergence :**

- en cas de variations importantes des températures;
- après une période de froid (moins de 10 °C) et en particulier si elle est associée à des précipitations;
- en cas de gelée nocturne;
- si la température est supérieure à 25°C ou inférieure à 8 °C et sur maïs en croissance ralentie ou affaibli par des températures basses ou par la sécheresse, par des carences minérales, par des dégâts d'insectes ou par toute autre cause.

• **Sélectivité :**

–Lors d'une application par conditions climatiques froides et/ou humides, une phytotoxicité peut parfois être observée. Sur sol très humide ou en cas de fortes pluies peu après l'application, ou dans le cas d'une culture très affaiblie, une réaction temporaire peut apparaître sous forme d'un jaunissement provisoire des feuilles et d'un recroquevillement des jeunes feuilles. Ces phénomènes n'ont cependant pas d'effet sur le rendement.

• **Cultures suivantes :**

- Après la récolte du maïs, l'escourgeon et le froment d'hiver sont possibles dans un assolement normal et après un travail profond du sol (min. 15 cm de profondeur et un brassage homogène du sol). Le ray-grass est possible après un labour.
- Au printemps après la récolte du maïs, les cultures suivantes sont possibles après un travail profond du sol (min. 15 cm) : froment de printemps et orge de printemps. Du colza, des pommes de terre et des betteraves sont possibles après un travail profond du sol de min. 15 cm de profondeur et un brassage homogène du sol.
- **Remarque:** les cultures suivantes sont basées sur des essais au champ dans des sols avec des paramètres du type de sol normaux, favorables (dans les zones de valeurs souhaitables e.a. % C, % N org., pH) et dans des conditions agroclimatologiques normales. Des paramètres du type de sol défavorables ou des conditions agroclimatologiques défavorables, comme de longues périodes de sécheresse après l'application, des températures froides, de la saturation hydrique, des sols compactés, des zones érodées, ... peuvent impacter la vitesse de dégradation de l'herbicide et la quantité résiduelle de matière active. Dans de pareils cas, le risque pour les cultures suivantes peut être réduit par un labour approprié, préalable au semis de la culture suivante. Ce travail de sol brassera suffisamment le sol de différentes profondeurs. Toute forme de techniques culturales simplifiées n'est pas recommandée dans ces circonstances.
- L'implantation de toute autre culture se fera sous l'entière responsabilité de l'utilisateur.

• **Cultures de remplacement (en cas d'échec de la culture) :**

- En cas d'échec du maïs, une nouvelle culture de maïs peut être semée après une semaine et après un travail profond du sol.
 - Pour plus des informations concernant les cultures de remplacement possibles en cas d'échec de la culture, veuillez contacter votre distributeur ou Bayer CropScience.
- ### • **Compatibilité :**
- En post-levée, ne pas mélanger avec de l'huile ou d'autres adjuvants, des engrais liquides ou des engrais foliaires.
 - Pour les mélanges possibles, contactez votre distributeur de produits phytosanitaires.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE, TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

Agiter le bidon avant l'emploi.

Remplir la cuve à 1/2 d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter le volume de la cuve. L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins.

De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

NETTOYAGE DU PULVÉRISATEUR

Koloss® TCMax contient une matière active du type ALS (auquel appartiennent les sulfonylurées). De ce fait, il est très important de bien nettoyer la cuve, les tuyaux et les filtres avant de passer dans d'autres cultures que le maïs.

MESURES POUR EVITER LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE

- SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme et des routes.
- SPe2: Pour protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme „sterk erosiegevoelig“. Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre.
- SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface. Voir les instructions spécifiques à la culture sous la rubrique 'Usage et dose d'emploi'.
- En plus des zones tampons mentionnées sur l'étiquette, des zones tampons régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.
- Réduction de la dérive: Eviter la dérive sur la végétation, les plans et les cours d'eau par l'utilisation d'un équipement de pulvérisation approprié et en ajustant la quantité d'eau et la vitesse. Pulvériser en l'absence de vent et avec une pression adaptée conformément aux recommandations spécifiques pour les buses antidérive.

MESURES DE PRECAUTION

- Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
- Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.
- Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.
- Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

INDICATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS

Premiers soins

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION:

Rincer la bouche.
Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS D'INHALATION:

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

Enlever les vêtements contaminés.
Laver abondamment à l'eau.
En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Pour des informations complémentaires, contacter le **Centre Antipoisons +32 (0)70/245.245.**

GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur: nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.



KOLOSS TCMax

1 L

Selectief herbicide in maïs
in voor-opkomst en vroege na-opkomst
tegen eenjarige grasachtige
en eenjarige tweezadlobbige onkruiden.

Herbicide sélectif pour maïs
en pré-émergence
et en post-émergence précoce
contre les graminées
et dicotylées annuelles.

Gevarenaanduidingen

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P411 Bij maximaal 40°C bewaren.

Aanvullende informatie

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Mentions de danger

H361d Susceptible de nuire au fœtus.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P263 Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement.
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P391 Recueillir le produit répandu.
P411 Stocker à une température ne dépassant pas 40°C.

Informations supplémentaires

EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazool-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Gefahrenhinweise

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P263 Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.
P308+ P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P411 Bei Temperaturen nicht über 40°C aufbewahren.

Ergänzende Informationen

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Toelatingsnummer: 10464P/B

Suspensie concentraat (SC) op basis van

90 g/l (7,6% w/w) thiencarbazone-methyl,
225 g/l (19% w/w) isoxaflutol
en 150 g/l (12,7% w/w) cyprosulfamide (beschermstof).

Numéro d'autorisation: 10464P/B

Suspension concentrée (SC) à base de

90 g/l (7,6% w/w) de thiencarbazone-méthyl,
225 g/l (19% w/w) d'isoxaflutole
et 150 g/l (12,7% w/w) de cyprosulfamide (phytoprotecteur).

Werkingswijze/Mode d'action

GROUP	2	27	HERBICIDE
-------	---	----	-----------

Koloss® TCMax: Trademark of Bayer Group

Lotnummer/Numéro de lot: zie op de verpakking/voir sur l'emballage.

Label version: 08/2023


© Copyright Bayer CropScience

BE84910643G

Tel. Antigifcentrum/Le Centre Antipoisons: 070/245.245

UFI : J8Q0-80HU-Y006-5A03

GHS08



GHS09



WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG



www.agrirecover.eu

Toelatingshouder/Détenteur de l'autorisation:

Bayer CropScience SA-NV

Jan Mommaertslaan 14

1831 Diegem (Machelen)

Tel. 02/535 63 11

www.cropscience.bayer.be

Bayer