



Luna® CARE

12 kg

FUNGICIDE/PLANTVERSTERKER VOOR GEBRUIK IN APPEL EN PEER FONGICIDE/ACTIVATEUR DE DÉFENSE DES PLANTES POUR USAGE EN POMMIERS ET POIRIERS

ART-NR: 81764352

GEBRUIK EN GEBRUIKSOSISSEN

Lees aandachtig het etiket voor gebruik.

Titeit	Bter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip van de teelt
Appelbomen (open lucht)	Schorft, echte meeldauw en ter vermindering van de infectiedruk door bacterievuur	1,75 kg product/ha haag (max. 3 kg/ha grondoppervlak)	Vanaf het zwellen van de bloemknoppen (knopscruibben verleugend en hebben lichtgekleurde vlekken) (BBCH 51) tot wanroer de nog gesloten bloemknoppen zichtbaar zijn (BBCH 55).
Toepassingsvooraanvallen:			
			• Max. 3 toepassingen/12 maanden met een interval van 7 tot 10 dagen. • Luna® Care in appel niet toepassen tijdens de bloei. • Niet meer dan twee opeenvolgende behandelingen met Luna® Care uitvoeren in appel. • Luna® Care NIET toepassen op het ras Golden Delicious omwille van mogelijke fytotoxiciteit op dit dunne blad. • Risicobeperkende maatregelen: altijd minimum 50 % driftreductie toepassen over het volledige veld. Bovendien een bufferzone van 20 meter respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 28 dagen. • Om omstanders en omwonenden te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie van 50% toe te passen.
Perenbomen (open lucht)			
			• Max. 3 toepassingen/12 maanden met een interval van 7 tot 10 dagen. • Niet meer dan twee opeenvolgende behandelingen met Luna® Care uitvoeren in peer. • Risicobeperkende maatregelen: altijd minimum 50 % driftreductie toepassen over het volledige veld. Bovendien een bufferzone van 20 meter respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 28 dagen. • Om omstanders en omwonenden te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie van 50% toe te passen.
Toepassingsvooraanvank: bespotting Algemene opmerking betreffende de dosis			
De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd(en) te verkorten.			

BLIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor beroepsgebruik.

- Dit product dient als plantenversterker en reduceert de waardplantgevoeligheid voor bacteriën en schimmels.

Interferentie met andere middelen:

- Wanneer Luna® Care snel wordt ingezet na een dunning met bv. Globaryl® 100, Exilis®, MaxCel® (benzyldadenine-gebaseerde middelen) kan mogelijk een iets fellere vruchtdriving plaatsvinden.
- Bij de inzet van Brevis® om te dunnen, wordt aanbevolen om voor Luna® Care een interval van 7 dagen voor en na de Brevis® toepassing te voorzien omdat mogelijk een iets fellere dunning kan plaatsvinden.

Maatregelen ter voorkoming van resistentievermindering:

- Het wordt aangeraden Luna® Care preventief toe te passen in een blok van twee opeenvolgende behandelingen voor een maximaal intrinsiek fungicide- en plantenversterkend effect, en dan in afwisseling met andere middelen die tot andere chemische families behoren en die een verschillende werkingswijze hebben.
- SPAf: Om resistentieopbouw te voorkomen, moet u dit product, na het blok van twee behandelingen, afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 7 en P07 (33).

Mengbaarheid:

- In geval van tankmixing met andere fytoprotectoren, eerst de SC formuleringen in de sputtanks brengen gevolgd door Luna® Care en nadelen de andere WG formuleringen. Als laatste eventuele EC-formuleringen toevoegen en vervolgens de andere producten (poeders gevolgd door vloeistoffen) aan de sputtoplossing toevoegen. Het is aangewezen om direct de roirstralinatie in werking te zetten en minimum 10 minuten te laten draaien voor het begin van de bespotting.
- Aanbeveling voor gewasbehandeling met fluopyram bevattende middelen om overmatige belasting van het milieu te voorkomen:

Luna Care bevat 5% w/w fluopyram. Er kunnen meerder producten op basis van fluopyram in een grondgebonden teelt toepassen zijn. De totale hoeveelheid fluopyram die jaarlijks via een vegetatiebehandeling op een perceel kan worden toegepast is maximaal 500 gram fluopyram per hectare. Dit maximum per kalenderjaar per perceel in grondgebonden teelt is ook inclusief eventuele toepassingen in volgtrekkende in hetzelfde kalenderjaar. Hou hier rekening mee in uw gewasbeschermingsplan.

BEREIDING VAN DE SPUTTOPLOSSING, BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING EN BEHANDELINGS-OVERSCHOTEN
Het product in de voor 1/2 gevulde sputtank gieten. Mengen en verder met water aanvullen. De zorgvuldig geleidde verpakking van dit product dient met water gespoten te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden), ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuitstrooiteel geplaatst is. Het bekende spoelwater moet in de sproeitank gegeven worden. De aldis gespotte verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelplaats.

De behandelingsoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvoorchriften. Vivers, waterlopen, beren en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden.

Om sputtoverschoten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid sputtstrooiteel nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hektare.

MAATREGelen TER VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN HET GROND- EN OPPERVLAKTewater

• SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Reinig de apparatuur niet in de buit van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.

• SP2: Om in het water levende organismen te beschermen, mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geklasseerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgeving toegepast worden, is het gebruik wel toegestaan.

• SP3: Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen. Voor instudies bij een specifieke teelt: zie rubriek 'Gebruik en gebruiksdossissen'.

• Naast op dit effect vermedele bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootte.

• Driftreductie: vermijd sputtstrooiflaan naburige vegetatie, gronden en waterlopen door een aangepaste sputtoplassing, waterhoeveelheid en rijnseheid. Spuit in windstil weer met aangepaste druk naargelang de specifieke aanbevelingen voor driftreductie dopen.

VOORZORGSMATREGELEN

• Geleve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldt.

• Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloestofdichte schoeisel of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

• Dit product in een originele gesloten verpakking voorstrijk bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

• SPo: na de behandeling der percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de sputtstrooiflaan is opgedroogd.

• Om omstanders en omwonenden te beschermen dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen: zie rubriek 'Gebruik en gebruiksdossissen'.

• Om omstanders en omwonenden te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie van 50% toe te passen.

AANWIJZINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medische hulp, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en enigszins zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onvoldoende luchtofferting de LUNA CARE of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Verontreinigd afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel weg het niet-aangestuurde oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245.

WAARBORG: Elk fabrikaat wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de doer van koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, de schade of nadelen berokkend aan een mens, dieren, planten of werk具gen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak deelt uit te wijzen is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

USAGE ET DOSES D'EMPLOI

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation du produit.

Cultuur	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application de la culture
Pommiers (plein air)	La tavelure du pommier, l'oidium du pommier et du poirier et pour réduire la pression d'infection du feu bactérien	1,75 kg produit/ha de haie (max. 3 kg/ha de sol)	A partir du gonflement des boutons des inflorescences (les écaillles des tâches claires et s'allongent) (BBCH 51) jusqu'à ce que les premiers boutons floraux (toujours fermés) soient visibles (BBCH 55)
Conditions d'application:			
			• Max. 3 applications/12 mois avec un intervalle de 7 à 10 jours. • Ne pas appliquer le Luna® Care pendant la floraison des pommières. • Ne pas effectuer plus de deux traitements successifs avec Luna® Care en pommiers. • Ne pas appliquer le Luna® Care sur la variété Golden Delicious à cause de la phytotoxicité possible sur ces feuilles plus mûres. • Mesures de réduction du risque: toujours appliquer un pourcentage minimum de 50 % de réduction de la dérive sur toute la parcelle. En plus, respecter une zone tampon de 20 mètres entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Début avant récolte: 28 jours. • Afin de protéger les personnes présentes sur les lieux lors du traitement et les résidents, respecter un pourcentage minimum de réduction de dérive de 50%.

Cultuur	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application de la culture
Poiriers (plein air)	La tavelure du poirier, la stampyllose de l'oidium du poirier et du pommier, la chanceuse ou pourriture de l'œil, la bactérose des boutons floraux et pour réduire la pression d'infection du feu bactérien	1,75 kg produit/ha de haie (max. 3 kg/ha de sol)	A partir de deux semaines après la fin de la floraison; discrépance des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison (BBCH 71) jusqu'au début de la maturation des fruits (la couleur spécifique de la variété apparaît en plus clair) (BBCH 81)
Conditions d'application:			
			• Max. 3 applications/12 mois avec un intervalle de 7 à 10 jours. • Ne pas appliquer le Luna® Care pendant la floraison des poiriers. • Ne pas effectuer plus de deux traitements successifs avec Luna® Care en poiriers. • Ne pas appliquer le Luna® Care sur la variété Golden Delicious à cause de la phytotoxicité possible sur ces feuilles plus mûres. • Mesures de réduction du risque: toujours appliquer un pourcentage minimum de 50 % de réduction de la dérive sur toute la parcelle. En plus, respecter une zone tampon minimale de 20 mètres entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Début avant récolte: 28 jours. • Afin de protéger les personnes présentes sur les lieux lors du traitement et les résidents, respecter un pourcentage minimum de réduction de dérive de 50%.

Cultuur	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application de la culture
Pommiers (plein air)	La tavelure du pommier, l'oidium du pommier et du poirier, la chanceuse ou pourriture de l'œil, la bactérose des boutons floraux et pour réduire la pression d'infection du feu bactérien	1,75 kg produit/ha de haie (max. 3 kg/ha de sol)	A partir de la fin de la floraison: tous les pétales sont tombés (BBCH 69) jusqu'au moment où les fruits ont atteint environ 90% de leur taille finale (BBCH 79)
Conditions d'application:			
			• Max. 3 applications/12 mois, avec un intervalle de 7 à 10 jours. • Ne pas appliquer le Luna® Care pendant la floraison des poiriers. • Ne pas effectuer plus de deux traitements successifs avec Luna® Care en pommiers. • Ne pas appliquer le Luna® Care sur la variété Golden Delicious à cause de la phytotoxicité possible sur ces feuilles plus mûres. • Mesures de réduction du risque: toujours appliquer un pourcentage minimum de 50 % de réduction de la dérive sur toute la parcelle. En plus, respecter une zone tampon minimale de 20 mètres entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Début avant récolte: 28 jours. • Afin de protéger les personnes présentes sur les lieux lors du traitement et les résidents, respecter un pourcentage minimum de réduction de dérive de 50%.

Cultuur	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application de la culture
Poiriers (plein air)	La tavelure du poirier, la stampyllose de l'oidium du poirier et du pommier, la chanceuse ou pourriture de l'œil, la bactérose des boutons floraux et pour réduire la pression d'infection du feu bactérien	1,75 kg produit/ha de haie (max. 3 kg/ha de sol)	A partir de la fin de la floraison: tous les pétales sont tombés (BBCH 69) jusqu'au moment où les fruits ont atteint environ 90% de leur taille finale (BBCH 79)
Conditions d'application:			
			• Max. 3 applications/12 mois, avec un intervalle de 7 à 10 jours. • Ne pas appliquer le Luna® Care pendant la floraison des poiriers. • Mesures de réduction du risque: toujours appliquer un pourcentage minimum de 50 % de réduction de la dérive sur toute la parcelle. En plus, respecter une zone tampon minimale de 20 mètres entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Début avant récolte: 28 jours. • Afin de protéger les personnes présentes sur les lieux lors du traitement et les résidents, respecter un pourcentage minimum de réduction de dérive de 50%.

Cultuur	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application de la culture
Pommiers (plein air)	La tavelure du pommier, l'oidium du pommier et du poirier, la chanceuse ou pourriture de l'œil, la bactérose des boutons floraux et pour réduire la pression d'infection du feu bactérien	1,75 kg produit/ha de haie (max. 3 kg/ha de sol)	A partir de la fin de la floraison: tous les pétales sont tombés (BBCH 69) jusqu'au moment où les fruits ont atteint environ 90% de leur taille finale (BBCH 79)
Conditions d'application:			
			• Max. 3 applications/12 mois, avec un intervalle de 7 à 10 jours. • Ne pas appliquer le Luna® Care pendant la floraison des poiriers. • Mesures de réduction du risque: toujours appliquer un pourcentage minimum de 50 % de réduction de la dérive sur toute la parcelle. En plus, respecter une zone