

BE00052898P



5 kg

## Fungicide-strooipoeder voor het ontsmetten van aardappelpootgoed tegen lakschurft (*Rhizoctonia solani*).

## Fongicide à poudrer pour la désinfection des plants de pommes de terre contre le Rhizoctone (*Rhizoctonia solani*).

Toelatingsnummer: 7482P/B

Poeder voor droge zaadbehandeling (DS), op basis van 12,5 % pencycuron.

Numéro d'autorisation: 7482P/B  
Numéro d'agrément luxembourgeois: L 00984-017

Poudre pour enrobage à sec (DS), à base de 12,5% de pencycuron

### Mode d'action/ Werkingswijze:

GROUP 20 FUNGICIDE



Gevaarenaanduiding  
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Veiligheidsaanbevelingen

- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
- P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
- P501 Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevraagd of bijzonder afval.

#### Aanvullende informatie

- EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Mentions de danger  
H411 Toxicité pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Conseils de prudence

- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391 Recueillir le produit répandu.
- P501 Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

#### Information supplémentaire

- EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

#### Gefahrenhinweise

- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

#### Sicherheitshinweise

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501 Inhalt und Behälter einem Sammelpunkt für gefährlichen Abfall oder Sonderabfall zuführen.

#### Ergänzende Informationen

- EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Fungicide-strooipoeder voor het ontsmetten van aardappelpootgoed tegen lakschurft (*Rhizoctonia solani*).

Toelatingsnummer: 7482P/B

Poeder voor droge zaadbehandeling (DS), op basis van 12,5 % pencycuron.

#### GEBRUIK EN GEbruIKSDOSIS

Lees aandachtig het etiket voor gebruik.

Titeit	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Aardappelpootgoed (ontsmetting)	Lakschurft ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	200 g/100 kg plantenaardappelen (droogontsmetting)	Toepassen kort voor het planten in de kiembakken of tijdens het planten.
Toepassingsvoorwaarden: In kisten voor gekiemt potgoed in het voorjaar gelijkmatig met het product bedekken. Bij gebruik van een poottmachine vult men eerst de voorraadbak voor 1/3 met potgoed en strooit men de rest van de hoeveelheid Monceren® over. Vóór de bak volledig gevuld is, dient deze tweemaal te worden geslagen. Zoals de machine is ontworpen dat moet het potgoed in de bak in beweging komen en wordt het ontsmettingsmiddel gelijkmatig over alle plantenaardappelen verdeeld. Kleine partijen potgoed kunnen ook met een handverspreider worden behandeld. Hierbij dient men eveneens een gelijkmatige verdeling van het product in acht te nemen.			
Conditions d'application: Au printemps, les plants pré germés dans les caisses seront couverts de façon uniforme avec le produit. En cas d'emploi d'une planeteuse, remplir d'abord le bac d'alimentation au tiers avec des pommes de terre et puis ajouter avec la quantité nécessaire de Monceren®. Cette opération est répétée deux fois jusqu'à ce que la machine soit pleine. Des fois, lorsque la machine est en action, les plants bougent dans le bac, ce qui assure une répartition uniforme du produit de désinfection sur tous les plants. On peut utiliser des quantités de plantes de pommes de terre peuvent aussi être utilisées avec une poussette à main. Il faut dans ce cas également veiller à obtenir une répartition régulière du produit.			

#### BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor beroepsgebruik.
- Bedekken potgoed niet voor de oppervlakteleidende knollen, ook niet aan de rieren voorzien, zelfs niet na behandeling met onbehandelde knollen.
- Zorg voor een goede verfijning in het ontsmettingstoksal.
- Oppervlakken die met Monceren® poeder bestoven zijn, met een vochtige doek reinigen.

#### BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTEN

De lege verpakking moet worden gereinigd en volledig gedroogd. De lege gedroogde verpakking moet door de gebruiker ingeladen worden op een daarvoor voorzien inzamelpunt. Vivers, waterpoten, baken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor een ander doel. Om sputtvleestof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de benodigde hoeveelheid sputtvleestof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de behandelde oppervlakte en van het debet per hectare.

#### MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN DE GROND - EN OPPERVLAKTEARTER

SP1: Zorg ervoor dat u niet met het product en de verpakking geen water verontreinigt. Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer kan gaan en weg kan worden verontreinigd.

#### VOORZORGSMAAITREGELS

- Geleide de normale voor zorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen gelden.
- Op product in een originele gesloten verpakking voorzichtig bewaren in een frisse, droge en gesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

#### AANWIJNINGEN VOOR DE EERSTE HULP EN VOOR DE GENEESHEER

Symptomen	Eerste hulp maatregelen
Geen specifieke beschikbaar bij de mens; vermelde symptomen zijn afgeleid van dierenexperimenten.	Inademend: Irritatie van de longen.
Inademend: Irritatie van de longen.	Inademend: Irritatie van de longen.
Inslakken: geen specifieke symptomen (dierproeven)	Inslakken: Spoel mond, Geef wat water te drinken. Bel het Anticentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
Huid: lichte huidirritatie (dierproeven)	Huid: Spoel de huid overredig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder onverdroogde verontreinigde kleding en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en ton het etiket of de verpakking.
Ogen: lichte voorbijgaande oogirritatie (dierproeven)	Ogen: Spoel overredig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangestane oog. Bij contactlenzen: zo makelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts.
Opmerkingen voor de arts	
• Prehospital: symptomatische behandeling.	
• Contacteer het Anticentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.	
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Anticentrum 070/245.245	

#### WAARBORG

Elke fabrikant wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispijkelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarrborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid voor de resultaten van de toepassing van ons product af. Nadat berichtgegeven aan mensen, dienen, planten en dierlijke behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beschikt.

Fongicide à poudrer pour la désinfection des plants de pommes de terre contre le Rhizoctone (*Rhizoctonia solani*).

Numéro d'autorisation : 7482P/B

Numéro d'agrément luxembourgeois : L 00984-017

#### USAGE ET DOSE D'EMPLOI

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation du produit.

Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Plants de pommes de terre (désinfection)	Rhizoctone de la pomme de terre ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	200 g/100 kg plants de pommes de terre (désinfection à sec)	Appliquer peu avant la plantation dans les caisses de germination ou durant la plantation.

#### CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

- Produit destiné à un usage professionnel.
- Ne pas utiliser les plantes traitées pour la consommation humaine ou animale, et mélanger en mélange avec des tubercules non traités.
- Veiller à une bonne aération du local de désinfection.
- Nettoyer avec un linge humide les surfaces souillées avec du Monceren®.

#### TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

Vider soigneusement et complètement l'emballage. L'emballage ainsi vidé devra être ramené par l'utilisateur pour le ramaillage prévu à cet effet.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage. L'emballage ne doit en aucun cas être utilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

#### MESURES POUR EVITER LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE

SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme et des routes.

#### MESURES DE PRÉCAUTION

- Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
- Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

#### INDICATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS ET POUR LE MEDECIN

Symptômes:	Premiers soins
Peu de données disponibles chez l'homme, les symptômes ci-dessous proviennent d'études chez l'animal.	
Inhalation: irritation des muqueuses (essais animaux)	
Ingestion: pas de symptôme spécifique (essais animaux)	
Peau: légère irritation de la peau (essais animaux)	
Yeux: légère irritation transitoire des yeux (essais animaux)	
Remarque pour le médecin	
• Prise en charge : traitement symptomatique.	
• Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.	
Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245 Pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500	

#### GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur; nous réservons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

Monceren® - Trademark of Bayer Group

Lotnummer/Numéro du Lot :

Zie op de verpakking/Voir sur l'emballage.

Labelversie 07/2019

© Copyright Bayer CropScience



Toelatingshouder/Détenteur de l'autorisation:  
Bayer CropScience SA-NV  
J.E. Mammartaalstraat 14  
1831 Diegem (Machelen)  
tel. 02/535 63 11  
www.cropscience.bayer.be

Bayer