



Fandango®

5 L

Systemisch fungicide voor winter- en zomergerst, wintertarwe, triticale, spelt, rogge, graszaadteelt en uien in open lucht.

Fongicide systémique pour l'orge d'hiver et de printemps, froment d'hiver, triticale, épeautre, seigle, cultures de graminées et oignons en plein air.



BE85756729G

Hier openen - ouvrir ici

Fandango®

Gevarenaanduidingen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P410 Tegen zonlicht beschermen.

Aanvullende informatie

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Mentions de danger

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.

P391 Recueillir le produit répandu.

P410 Protéger du rayonnement solaire.

Information supplémentaire

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Gefahrenhinweise

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.


P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen.

Ergänzende Information

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GHS09



WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG

Werkingswijze/Mode d'action

GROUP

3

11

FUNGICIDES

Toelatingsnummer: 9458P/B

Emulgeerbaar concentraat (EC), op basis van

100 g/l (8,8% w/w) prothioconazole
en 100 g/l (8,8% w/w) fluoxastrobin

Tel. Antifocentrum/Centre Antipoisons: 070/245.245

Pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

UFI: MEC0-G0JU-C00U-T9JY



www.agrirecover.eu

Toelatingshouder/Détenteur d'autorisation:

Bayer CropScience SA-NV

Jan Mommaertslaan 14

1831 Diegem (Machelen)

Tel. 02/535 63 11

www.cropscience.bayer.be

Fandango® - Trademark of Bayer Group

Lotnummer/Numéro de lot :

zie op de verpakking/voir sur l'emballage.

Labelversie 07/2023

© Copyright Bayer CropScience

BE85821504G

Bayer

GEBRUIK EN GEBRUIKSDOSISSEN

Lees aandachtig het etiket voor gebruik. De gewasgroepen in de tabel hieronder geven structuur aan het etiket. Enkel de specifiek vermelde gewassen onder de kolom 'teelt' zijn toegelaten. De gebruiksvoorwaarden moeten per gewas geraadpleegd worden.

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingsstijp van de teelt
A. GRANEN			
Winter- en zomergerst (inclusief zaadproductie) (open lucht)	Oogvlekkenziekte	1, 25 l/ha	In het stadium 'begin strekking' tot 'tweede knoop' (BBCH 30-32). Maximum 1 toepassing.
	Netvlekkenziekte/strepenziekte, bladvlekkenziekte, dwergroest en echte meeldauw	1,25 l/ha	In het stadium 'eerste knoop' tot 'eerste kafnaalden zichtbaar' (BBCH 31-49). Maximum 2 toepassingen met een interval van 14 dagen.
	Toepassingsvoorwaarden: - In totaal maximum 2 toepassingen/teelt. - Risicobeperkende maatregelen: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		
Wintertarwe, winter- en zomertriticale en winter- en zomerspelt (inclusief zaadproductie) (open lucht)	Oogvlekkenziekte	1,5 l/ha	In het stadium 'eerste tot tweede knoop' (BBCH 31-32). Maximum 1 toepassing
	Echte meeldauw, bruine roest, gele roest, bladvlekkenziekte/septoriose, netvlekkenziekte/strepenziekte, kafjesbruin en fusarium.	1,5 l/ha	In het stadium '1 ^{ste} knoop' tot 'volle bloei' (BBCH 31-65). Maximum 2 toepassingen met een interval van 14 dagen
	Toepassingsvoorwaarden: - In totaal maximum 2 toepassingen/teelt. - Risicobeperkende maatregelen: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		
Winter- en zomerrogge (inclusief zaadproductie) (open lucht)	Echte meeldauw, bladvlekkenziekte en bruine roest	1,5 l/ha	In het stadium '2 ^{de} knoop' tot 'einde aarvorming' (BBCH 32-59)
	Toepassingsvoorwaarden: - In totaal maximum 2 toepassingen/teelt, met een interval van 14 dagen. - Risicobeperkende maatregelen: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		
B. GROENVOEDER- EN BRAAKLANDGEWASSEN			
Graszaadteelt (open lucht)	Echte meeldauw, netvlekkenziekte/strepenziekte, kroonroest en zwarte roest	1,25 l/ha	In het stadium '2 ^{de} knoop -tot 'einde aarvorming' (BBCH 32-59)
	Toepassingsvoorwaarden: - In totaal maximum 1 toepassing/teelt. - Risicobeperkende maatregelen: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		
C. BOLGEWASSEN			
Uien (droog-geogste) (open lucht)	Valse meeldauw en witvlekkenziekte	1 - 1,25 l/ha	In verband met de kans op gewasreactie dient de eerste behandeling met het product plaats te vinden nadat bolvorming zichtbaar is geworden
	Toepassingsvoorwaarden: - Maximum 4 toepassingen/teelt, met een interval van 5-10 dagen. - Risicobeperkende maatregelen: een bufferzone van 20 meter met 75 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. - Veiligheidstermijn voor de oogst: 14 dagen.		

Toepassingstechniek: bespuiting

Algemene opmerkingen/aanbevelingen:

- Verpakking goed schudden voor gebruik. Spuitapparatuur voor gebruik goed controleren op aanwezigheid van ongewenste productresten, mogelijke verstoppingen, ...
- Fandango® dient toegepast te worden met een watervolume van 150 à 400 l/ha. Tijdens de bespuiting de spuitboomhoogte in functie van het dooptype aanpassen aan de hoogte van het gewas. Bij dicht gewas de waterhoeveelheid optrekken naar 300-400 l/ha.
- Liefst toepassen op een droog gewas.
- Fandango® niet toepassen tijdens een vorstperiode of als er binnen de 2 uren na de toepassing regen wordt verwacht.
- Het mogelijk optreden van resistente of minder gevoelige ziektestammen kan niet worden uitgesloten of voorspeld. Indien resistente of minder gevoelige ziektestammen zouden optreden, kan Fandango® minder werkzaam zijn. Het respecteren van de erkende dosis blijft de meest aangewezen maatregel om resistentie tegen te gaan.

Algemene opmerking betreffende de dosis:

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd te verkorten.

BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor beroepsgebruik.
- **Maatregelen ter voorkoming van resistentievorming:**
SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 11 en 3.

BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING, BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKINGEN EN BEHANDELINGS-OVERSCHOTTEN

Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder met water aanvullen.

De zorgvuldig geleedigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met ten onder druk dat op het sproei toestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden.

De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. De behandelingsoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvorschriften.

Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking.

De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden.

Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN HET GROND- EN OPPERVLAKTEWATER

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigt.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen. Voor instructies bij een specifieke teelt: zie rubriek 'Gebruik en gebruiksdosissen'.
- Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.
- Driftreductie: Vermijd spuitdrift naar naburige vegetatie, gronden en waterlopen door een aangepaste spuitapparatuur, waterhoeveelheid en rijsnelheid. Spuit bij windstil weer met aangepaste druk naargelang de specifieke aanbevelingen voor driftreducerende doppen.
- Erosiegevoelige percelen: het is ten zeerste aanbevolen om erosie beperkende maatregelen te nemen op percelen die erosiegevoelig zijn om afspoeling naar oppervlaktewater tegen te gaan.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldig zijn.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeiستofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.
- Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.
- SPO: Na de behandeling de percelen/ oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

AANWIJZINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Eerste hulp maatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen.

Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer **het Antigifcentrum 070/245.245.**

WAARBORG:

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

USAGE ET DOSES D'EMPLOI

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation du produit. Dans le tableau ci-dessous, les plantes cultivées ont été regroupées afin de structurer l'étiquette. Seules les cultures mentionnées dans la colonne 'culture' sont autorisées. Les conditions d'utilisation doivent être consultées pour chaque culture.

Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application de la culture
A. CEREALES			
Orge d'hiver et de printemps (y compris production de semences) (plein air)	Le piétin-verse	1,25 l/ha	Entre le stade 'début montaison' et le stade où les premières arêtes (barbes) sont visibles (BBCH 30-32) Maximum 1 application.
	L'helminthosporiose, la rhynchosporiose, la rouille naine et l'oïdium	1,25 l/ha	Entre le stade '1 ^{er} nœud' et le stade '1 ^{ère} barbe' (BBCH 31-49) Maximum 2 applications avec un intervalle de 14 jours
Conditions d'application: - Au total maximum 2 applications/culture.. - Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface.			
Froment d'hiver, triticale d'hiver et de printemps et épeautre d'hiver et de printemps (y compris production de semences) (plein air)	Le piétin-verse	1,5 l/ha	Au stade '1 ^{er} - 2 ^e nœud' (BBCH 31-32) Maximum 1 application
	L'oïdium, la rouille brune, la rouille jaune, la septoriose des feuilles, l'helminthosporiose, la septoriose de l'épi et la fusariose	1,5 l/ha	Du stade 1 ^{er} nœud au stade pleine floraison (BBCH 31 - 65) Maximum 2 applications avec un intervalle de 14 jours
Conditions d'application: - Au total maximum 2 applications/culture.. - Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface.			
Seigle d'hiver et de printemps (y compris production de semences) (plein air)	L'oïdium, la rhynchosporiose et la rouille brune	1,5 l/ha	Du stade '2 ^{ème} nœud' au stade 'épiaison' (BBCH 32-59)
Conditions d'application: - Maximum 2 applications/culture, avec un intervalle de 14 jours. - Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface.			
B. PLANTES FOURRAGERES ET DE JACHERE			
Cultures de graminées (production de semences) (plein air)	L'oïdium, l'helminthosporiose, la rouille couronnée des graminées et la rouille noire.	1,25 l/ha	Du stade '2 ^{ème} nœud' au stade 'fin de l'épiaison' (BBCH 32-59)
	Conditions d'application: - Maximum 1 application/culture. - Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
C. LEGUMES-BULBES			
Oignons (récoltés secs) (plein air)	Le mildiou de l'oignon et la brûlure des feuilles de l'oignon	1-1,25 l/ha	Du fait de la probabilité de réaction de la culture, le premier traitement avec le produit doit se faire dès l'apparition des bulbes
	Conditions d'application - Maximum 4 applications/culture, avec un intervalle de 5-10 jours. - Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 75 % entre la culture à traiter et les eaux de surface. - Délai avant récolte: 14 jours.		

Méthode d'application : pulvérisation

Remarques/Recommandations générales:

- Bien agiter l'emballage avant l'emploi. Contrôler le pulvérisateur avant utilisation et vérifier l'absence de restes de produits dans la cuve, bouchage éventuel, ...
- Fandango® sera appliqué avec un volume d'eau de 150 à 400 l/ha. Pendant la pulvérisation adapter la hauteur de la rampe en fonction du type de jet et de la hauteur de la végétation.
Si la végétation est dense, il est recommandé d'utiliser un volume d'eau de 300 à 400 l/ha.
- Traiter de préférence sur une végétation sèche.
- Ne pas appliquer Fandango® pendant une période de gel ou en cas de risque de pluie endéans les 2 heures.
- On ne peut pas exclure ni prévoir la possible apparition de souches résistantes ou moins sensibles. Dans de telles circonstances, Fandango® peut s'avérer moins efficace.
Le respect de la dose agréée reste le meilleur moyen pour garantir un résultat optimal.

Remarque générale concernant la dose:

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

- Produit destiné à un usage professionnel.
- **Mesures pour la prévention du développement de la résistance :**
SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes FRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 11 et 3.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE, TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

Remplir la cuve à 1/2 d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter le volume de la cuve. L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.
Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

MESURES POUR EVITER LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE

- SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface.
Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme et des routes.
- SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface. Voir les instructions spécifiques à la culture sous la rubrique 'Usage et doses d'emploi'.
- En plus des zones tampons mentionnées sur l'étiquette, des zones tampons régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large. Réduction de la dérive : Éviter la dérive sur la végétation, les plans et les cours d'eau par l'utilisation d'un équipement de pulvérisation approprié et en ajustant la quantité d'eau et la vitesse. Pulvériser en l'absence de vent et avec une pression adaptée conformément aux recommandations spécifiques pour les buses antidérive.
- Parcelles sensibles à l'érosion : il est recommandé de mettre en place des mesures adaptées sur les parcelles sensibles à l'érosion afin d'empêcher le ruissellement vers les eaux de surface.

MESURES DE PRECAUTION

- Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
- Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.
- Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.
- SPO: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

INDICATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS

Premiers soins En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.	
EN CAS D'INGESTION:	Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
EN CAS D'INHALATION:	Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:	Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:	Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
Pour des informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons +32 (0)70/245.245. Pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500	

GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur: nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

Fandango®

Gevenaanduidingen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P410 Tegen zonlicht beschermen.

Aanvullende informatie

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Mentions de danger

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.

P391 Recueillir le produit répandu.

P410 Protéger du rayonnement solaire.

Information supplémentaire

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Gefahrenhinweise

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.


P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen.

Ergänzende Information

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GHS09



WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG

Werkingswijze/Mode d'action

GROUP

3

11

FUNGICIDES

Toelatingsnummer: 9458P/B

Emulgeerbaar concentraat (EC), op basis van

100 g/l (8,8% w/w) prothioconazole

en 100 g/l (8,8% w/w) fluoxastrobin

Número d'autorisation belge : 9458P/B

Número d'agrément luxembourgeois: L01692-017

Concentré émulsionnable (EC), à base de

100 g/l (8,8% w/w) de prothioconazole

et 100 g/l (8,8% w/w) de fluoxastrobine

Tel. Antigifcentrum/Centre Antipoisons: 070/245.245

Pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

UFI: MEC0-G0JU-C00U-T9JY



www.agrirecover.eu

Fandango® - Trademark of Bayer Group

Lotnummer/Numéro de lot :

Zie op de verpakking/Voir sur l'emballage.

Labelversie 07/2023

© Copyright Bayer CropScience

BE85821504G

Toelatingshouder/Détenteur d'autorisation:

Bayer CropScience SA-NV

Jan Mommaertslaan 14

1831 Diegem (Machelen)

Tel. 02/535 63 11

www.cropsscience.bayer.be

Bayer